

เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก

“เด็กที่มีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก จะทำให้ไอคิวต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 5-10 จุด”


ธาตุเหล็ก **มือแรก** ของเด็กไทย



ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก และการคัดกรอง

ให้คำแนะนำอาหารตามวัย	6 เดือน	จ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก พร้อมรอบการฉีดวัคซีน	-
	9 เดือน	จ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก พร้อมรอบการฉีดวัคซีน	เจาะเลือด 1 ครั้ง
	1-2 ปี	จ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นั้ดรับต่อเนื่องทุก 3 เดือน และติดตามการกินยา	-
	3-5 ปี	จ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นั้ดรับต่อเนื่องทุก 3 เดือน และติดตามการกินยา	เจาะเลือด 1 ครั้ง ที่อายุ 4 ปี

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาเด็กซีด



*อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับกรรักษาภาวะโลหิตจางและฮาลัสซีเมีย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และ Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations, WHO.

