

ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 2557

ภาค	จำนวน ตัวอย่าง	median µg/L	range µg/L	p25 th µg/l	p75th µg/l	<150 µg/L		150-249 µg/L		250-499 µg/L		≥500 µg/L	
						จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาคกลาง (ขาด1จังหวัด)	7162	155.3	4-2451	102.3	238.8	3391	47.3	2137	29.8	1247	17.4	387	5.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5706	<b>127.6</b>	4-2297	74.0	214.3	3307	58.0	1286	22.5	816	14.3	297	5.2
ภาคเหนือ(ขาด2 จังหวัด)	4633	159.0	0-906	108.0	260.5	2159	46.6	1228	26.5	1046	22.6	200	4.3
ภาคใต้	4562	180.9	6-1435	122.4	267.8	1639	35.9	1639	35.9	1032	22.6	252	5.5
<b>รวม</b>	<b>22063</b>	<b>155.7</b>	<b>0-2451</b>	<b>99.0</b>	<b>244.1</b>	<b>10496</b>	<b>47.6</b>	<b>6290</b>	<b>28.5</b>	<b>4141</b>	<b>18.8</b>	<b>1136</b>	<b>5.1</b>

กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ สำนักโภชนาการ 12 /05 /2558