

ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์รายจังหวัดประจำปี 2566

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
1	เชียงราย	169.3	300 คน
	พะเยา	159.1	304 คน
	เชียงใหม่	167.5	378 คน
	น่าน	171.9	327 คน
	แม่ฮ่องสอน	156.7	250 คน
	ลำปาง	153.8	302 คน
	แพร่	172.5	267 คน
	ลำพูน	156.7	244 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 1	N	2,372 คน
		Median	163.6 µg/L
		Q1	108.2 µg/L
		Q3	237.8 µg/L
		Min-Max	10.2-806.0 µg/L
2	อุดรดิตถ์	111.6	268 คน
	สุโขทัย	154.0	299 คน
	พิษณุโลก	133.7	284 คน
	ตาก	112.0	316 คน
	เพชรบูรณ์	113.1	303 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 2	N	1,470 คน
		Median	122.6 µg/L
		Q1	65.8 µg/L
		Q3	201.3 µg/L
		Min-Max	10.3-483.0 µg/L
3	กำแพงเพชร	188.1	320 คน
	ชัยนาท	186.4	263 คน
	นครสวรรค์	181.5	323 คน
	พิจิตร	206.7	289 คน
	อุทัยธานี	199.0	296 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 3	N	1,491 คน
		Median	189.2 µg/L

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
		Q1	151.4 µg/L
		Q3	239.9 µg/L
		Min-Max	39.6-532.6 µg/L
4	ปทุมธานี	136.0	294 คน
	นนทบุรี	105.7	295 คน
	นครนายก	94.5	175 คน
	พระนครศรีอยุธยา	108.2	281 คน
	ลพบุรี	119.1	268 คน
	สระบุรี	164.1	346 คน
	สิงห์บุรี	100.2	179 คน
	อ่างทอง	101.4	262 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 4	N	2,100 คน
		Median	118.0 µg/L
		Q1	73.7 µg/L
		Q3	181.5 µg/L
		Min-Max	10.1-996.0 µg/L
5	กาญจนบุรี	129.0	293 คน
	นครปฐม	106.5	248 คน
	ประจวบคีรีขันธ์	129.1	298 คน
	เพชรบุรี	143.2	297 คน
	ราชบุรี	149.2	251 คน
	สมุทรสงคราม	127.9	260 คน
	สมุทรสาคร	95.4	300 คน
	สุพรรณบุรี	117.2	301 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 5	N	2,248 คน
		Median	122.3 µg/L
		Q1	77.1 µg/L
		Q3	185.1 µg/L
		Min-Max	10.0-988.0 µg/L

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
6	จันทบุรี	178.7	300 คน
	ฉะเชิงเทรา	256.3	330 คน
	ชลบุรี	168.7	320 คน
	ตราด	191.3	300 คน
	ปราจีนบุรี	160.2	333 คน
	ระยอง	159.3	265 คน
	สมุทรปราการ	162.4	299 คน
	สระแก้ว	177.1	271 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 6	N	2,418 คน
		Median	178.3 µg/L
		Q1	137.8 µg/L
		Q3	245.1 µg/L
		Min-Max	10.7-629.6 µg/L
7	กาฬสินธุ์	109.4	240 คน
	ขอนแก่น	126.4	310 คน
	มหาสารคาม	159.3	259 คน
	ร้อยเอ็ด	112.2	284 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 7	N	1,093 คน
		Median	126.5 µg/L
		Q1	69.8 µg/L
		Q3	205.2 µg/L
		Min-Max	10.6-525.6 µg/L
8	อุดรธานี	105.4	296 คน
	นครพนม	93.1	292 คน
	บึงกาฬ	117.9	301 คน
	เลย	111.0	289 คน
	สกลนคร	107.2	313 คน
	หนองคาย	103.5	292 คน
	หนองบัวลำภู	110.8	296 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 8	N	2,079 คน
		Median	106.7 µg/L
		Q1	60.4 µg/L

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
		Q3	184.6 µg/L
		Min-Max	10.1-965.9 µg/L
9	ชัยภูมิ	150.3	305 คน
	นครราชสีมา	164.2	319 คน
	บุรีรัมย์	160.6	282 คน
	สุรินทร์	148.3	308 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 9	N	1,214 คน
		Median	156.9 µg/L
		Q1	92.3 µg/L
		Q3	238.2 µg/L
		Min-Max	13.1-950.8 µg/L
10	มุกดาหาร	140.7	283 คน
	ยโสธร	160.0	336 คน
	ศรีสะเกษ	157.4	323 คน
	อุบลราชธานี	141.9	174 คน
	อำนาจเจริญ	177.7	227 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 10	N	1,343 คน
		Median	155.4 µg/L
		Q1	109.2 µg/L
		Q3	220.2 µg/L
		Min-Max	13.2-928.3 µg/L
11	กระบี่	176.9	282 คน
	ชุมพร	144.1	223 คน
	นครศรีธรรมราช	164.2	282 คน
	พังงา	183.5	99 คน
	ระนอง	180.6	162 คน
	สุราษฎร์ธานี	158.7	320 คน
	ภูเก็ต	167.4	242 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 11	N	1,610 คน
		Median	165.5 µg/L
		Q1	127.2 µg/L
		Q3	221.9 µg/L

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
		Min-Max	21.1-767.3 µg/L
12	ตรัง	138.8	291 คน
	นราธิวาส	151.2	279 คน
	ปัตตานี	147.5	253 คน
	พัทลุง	139.5	291 คน
	ยะลา	145.3	271 คน
	สงขลา	142.4	203 คน
	สตูล	166.5	309 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 12	N	1,897 คน
		Median	147.4 µg/L
		Q1	91.4 µg/L
		Q3	224.7 µg/L
		Min-Max	10.3-999.8 µg/L
สสม.	กทม	166.7	100 คน
รวมทั้งประเทศ	N	21,435 คน	
	Median	150.2 µg/L	
	Q1	94.1 µg/L	
	Q3	219.4 µg/L	
	Min-Max	10.0-999.8 µg/L	