ระดับที่ 4 ผลผลิต และระดับที่ 5 ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดที่ 3.16 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง

รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2568 สำนักโภชนาการ

<table>
<tr><th>ระดับ</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr>
<tr>
<td>ระดับที่ 4
Output
ผลผลิต</td>
<td>มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กำหนด

ร้อยละของหญิงที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ขณะตั้งครรภ์
<table>
<tr><td>ร้อยละ</td><td>81.0</td><td>82.0</td><td>83.0</td><td>84.0</td><td>85.0</td></tr>
<tr><td>คะแนน</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
<td> 

ร้อยละ 86.02 (HDC, 23 ก.ค.68)

คิดเป็น 1 คะแนน</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>ระดับ</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr>
<tr>
<td>ระดับที่ 5
Outcome
ผลลัพธ์
ของ
ตัวชี้วัด</td>
<td>มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง
<table>
<tr><td>ร้อยละ</td><td>32.0</td><td>31.5</td><td>31.0</td><td>30.5</td><td>30.0</td></tr>
<tr><td>คะแนน</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
<td> 

ร้อยละ 30.29 (HDC, 23 ก.ค.68)

คิดเป็น 0.9 คะแนน</td>
</tr>
</table>