

ตัวชี้วัดที่ 3.16 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง

รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระดับ 2

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

แผนการดำเนินงาน (รอบ 5 เดือนแรก ปี 2568)	เป้าหมาย	ระยะเวลา
1.ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังด้านโภชนาการ สำนักโภชนาการ	1 ครั้ง	ต.ค.67
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง	1 ครั้ง	พ.ย.67
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่เสี่ยง (หญิงตั้งครรภ์มีความรอบรู้ การกินยาไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก)	1 ครั้ง	พ.ย.67
4.อบรมเชิงปฏิบัติการนักร่างพลงอาหารระดับจังหวัด (Module โลหิตจาง)	1 ครั้ง	ธ.ค.67
5.จัดทำโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสตรีไทยเข้มแข็งแก่สถานประกอบการที่ร่วมควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง	1 ครั้ง	ม.ค.68
6.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 3 สารอาหารสำคัญ (ธาตุเหล็ก ไอโอดีน กรดโฟลิก) สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงตั้งครรภ์	1 ครั้ง	ก.พ.68
7.รณรงค์สตรีไทยเข้มแข็ง	1 ครั้ง	ก.พ.68