

ตัวชี้วัดที่ 3.16 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง

รอบ 5 เดือนหลัง ปังบประมาณ พ.ศ. 2568

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

แผนการดำเนินงาน (รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2568)	เป้าหมาย	ระยะเวลา
1. ลงพื้นที่ติดตามการรายงานข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในระบบ Health Data Center (รพ.บางบัวทอง และ สสจ.นนทบุรี)	1 ครั้ง	มี.ค.68
2. จัดทำความเห็นต่อข้อมูลประมาณการความชุกภาวะโลหิตจางในหญิงอายุ 15-49 ปี จำแนกตามภาวะตั้งครรภ์ ตามตัวชี้วัด SDGs 2.2.3 แก่ WHO	1 ครั้ง	มี.ค.68
3. จัดทำเนื้อหาด้านภาวะโลหิตจาง หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ เพื่อเป็นนักรสร้างพลเมืองอาหารระดับจังหวัด	1 ครั้ง	เม.ย.68
4. จัดทำถอดบทเรียนสาวไทยแถมแดงจากสถานประกอบการสู่สังคมสุขภาพดี	1 ครั้ง	เม.ย.68
5. จัดทำบทสรุป Thai women of childbearing aged Red-cheeks Campaign	1 ครั้ง	พ.ค.68
6. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่วางแผนมีบุตรและหญิงตั้งครรภ์ในคลินิก ANC	1 ครั้ง	มิ.ย.68