


1.1 Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ข้อมูล สารสนเทศที่นำมาใช้
ตัวชี้วัดที่ 3.10 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1.1 Assessment ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด

❖ แสดงผลผลิต ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ


แผนภูมิที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ระดับประเทศ
และเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไตรมาสที่ 4



ที่มา: ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ต.ค. 68

ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ระดับประเทศค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 คือ มีค่าในช่วงระหว่าง ร้อยละ 66.8 - 76.0 และเมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพพบว่าทุกเขตสุขภาพดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 90) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เขตสุขภาพที่ดำเนินการได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 12, 11, และ 9 คือ ร้อยละ 78.9, 77.9 และ 76.3 ตามลำดับ ซึ่งทั้งระดับประเทศและรายเขตสุขภาพยังมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 จึงเป็นประเด็นที่น่ากังวลว่า เด็กอายุ 0 - 5 ปี เกือบร้อยละ 30 ที่จะไม่ได้รับการประเมินภาวะการเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง และไม่ได้รับการแปลผลภาวะการเจริญเติบโต ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1


แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับประเทศและเขตสุขภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไตรมาสที่ 4



ที่มา: ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ต.ค. 68

สถานการณ์เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ค่อนข้างคงที่ซึ่งเพิ่ม-ลดอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 8.6 - 9.6 เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า เขตสุขภาพที่ 12, 10 และ 11 มีร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนด (ไม่เกินร้อยละ 8.0) คือ ร้อยละ 7.0 และพบเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนสูงอยู่ในภาคเหนือ (เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3 (ร้อยละ 10.0, 9.6 และ 10.8)) และภาคกลาง (เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 (ร้อยละ 12.7, 10.1 และ 9.9)) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ยังเป็นประเด็นท้าทายในการดำเนินงาน ซึ่งภาวะเริ่มอ้วน หมายถึง ภาวะที่น้ำหนักมากก่อนเกิดภาวะอ้วนชัดเจน เด็กมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่อ้วนในอนาคต หากไม่ควบคุมน้ำหนัก และภาวะอ้วนเป็นภาวะอ้วนชัดเจนมีน้ำหนักมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับส่วนสูงอย่างมาก เด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ขาโก่ง และเป็นผู้ใหญ่อ้วนมากยิ่งขึ้นในอนาคตหากไม่ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้


แผนภูมิที่ 3 ความชุกของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน (Overweight) ประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก



ข้อมูลจากแผนภูมิที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการด้านเกิน คือภาวะน้ำหนักเกินของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ประเทศไทย กับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีความชุกของภาวะน้ำหนักเกินอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเทศต้องกาจะพบเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินสูงสุด ร้อยละ 17.3 รองลงมาเป็นประเทศปาปัวนิวกินีและมองโกเลีย ร้อยละ 13.7 และร้อยละ 11.7 ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยมีระดับความชุกของภาวะน้ำหนักเกินอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน คือ ร้อยละ 8.2 อยู่ในอันดับที่ 7 แสดงให้เห็นว่าภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ยังเป็นปัญหาระดับนานาชาติที่ต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา

❖ แสดงผลผลิต ผลลัพธ์ระดับ T (Trends) แนวโน้ม


แผนภูมิที่ 4 แนวโน้มร้อยละความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไตรมาสที่ 4



ที่มา: ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ต.ค. 68

ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ คือ มีค่าในช่วงระหว่าง ร้อยละ 66.8 - 76.0 (แผนภูมิที่ 4) ข้อสังเกตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ลดลงเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจ สถานบริการสาธารณสุขระดับตำบลให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพ

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไตรมาสที่ 4




ที่มา: ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ต.ค. 68

ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ค่อนข้างคงที่ ซึ่งเพิ่ม – ลดอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 8.6 - 9.6 และพบว่า ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนยังไม่ผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนด (แผนภูมิที่ 5)

❖ แสดงผลผลิต ผลลัพธ์ระดับ LE (Level) ของผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 พบว่า ทุกเขตสุขภาพมีค่าร้อยละความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (แผนภูมิที่ 6)


แผนภูมิที่ 6 ร้อยละความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4



ที่มา: ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ต.ค. 68

สถานการณ์ของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.0 พบว่า เกือบทุกเขตสุขภาพมีค่าร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน สูงเกินค่าเป้าหมาย ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 12 บรรลุค่าเป้าหมาย (แผนภูมิที่ 7)

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4



ที่มา: ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ต.ค. 68